

**IMPORTANT: ALWAYS SHAKE OR STIR PRODUCT WELL BEFORE USE**  
**IMPORTANT : BIEN AGITER OU REMUER CE PRODUIT AVANT L'EMPLOI**

GROUP	<b>3</b>	FUNGICIDE
-------	----------	-----------

FONGICIDE	<b>3</b>	GROUPE
-----------	----------	--------

# RANCONA® 3.8 FS Fungicide

RANCONA® 3.8 FS Fungicide Seed Treatment provides protection from seed, seedling and soil-borne diseases caused by the listed organisms on field corn; sweet corn; popcorn; cereal grains (including wheat, barley, oats, rye and triticale); canola (including canola-quality *Brassica juncea*) and rapeseed.

This product contains no colourant. An appropriate colourant must be added when this product is applied. Regulations pertaining to colouration of treated seed under the *Seeds Act* must be strictly adhered to when using this product.

SUSPENSION

AGRICULTURAL

GUARANTEE: Ipconazole ..... 450 g/L

REGISTRATION NO. 29175, PEST CONTROL PRODUCTS ACT

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING

PROTECT FROM FREEZING

**24 HOUR EMERGENCY PHONE 1-866-744-3060**

GROWER INFORMATION 1-800-350-1745

Le Fongicide RANCONA® 3.8 FS protège des maladies transmises par les semences, les semis et le sol et causées par les organismes mentionnés sur le maïs de plein champ, le maïs sucré et le maïs à éclater; les céréales (y compris le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, et le triticale); le canola (y compris la *Brassica juncea* de qualité canola), et le colza.

Ce produit ne contient aucun colorant. Lorsqu'on applique ce produit, il faut y ajouter un colorant approprié. Quand on utilise ce produit, les règlements concernant la coloration des semences traitées, aux termes de la *Loi sur les semences*, doivent être strictement respectés.

SUSPENSION

AGRICOLE

GARANTIE : ipconazole ..... 450 g/L

N° D'HOMOLOGATION 29175, LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTES**

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L'UTILISATION

PROTÉGER DU GEL

**TELEPHONE D'URGENCE 24 HEURES SUR 24 : 1-866-744-3060**

INFORMATIONS POUR LES PRODUCTEURS : 1-800-350-1745



**Chemtura**  
AGROSOLUTIONS™

**Net Contents: 10 liters**

003/121812

SAP#522565 003 (0613)

Manufactured for:  
**Chemtura Canada Co./Cie**  
25 Erb Street  
Elmira, Ontario N3B 3A3

Fabriqué pour :  
**Chemtura Canada Co./Cie**  
25, rue Erb  
Elmira, ON N3B 3A3

[www.ChemturaAgroSolutions.com](http://www.ChemturaAgroSolutions.com)

**FIRST AID:**

**IF SWALLOWED:** Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give **any** liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

**IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin **IMMEDIATELY** with plenty of water for 15 to 20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take the container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

**TOXICOLOGICAL INFORMATION:**

There is no specific antidote if this product is ingested. Treat symptomatically.

This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia.

**ENVIRONMENTAL HAZARDS:**

Treated seed is toxic to birds and small wild mammals. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.

**PREMIERS SOINS :**

**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **AUCUN** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :**

Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas d'ingestion. Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.

**RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :**

Les semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et les petits animaux sauvages. Toutes les semences traitées qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être enfouies dans le sol ou ramassées.

## PRECAUTIONS:

1. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
2. **Commercial handlers:** When mixing, loading, applying or handling RANCONA 3.8 FS Fungicide, contaminated equipment or seed treated with RANCONA 3.8 FS Fungicide, wear long-sleeved shirt, long pants, shoes and socks, and chemical resistant gloves. In addition, wear a suitable dust mask when bagging or sewing bags of treated seed or when transferring seed to a storage bin.  
**On-farm handlers:** When mixing, loading, applying or handling RANCONA 3.8 FS Fungicide, contaminated equipment or seed treated with RANCONA 3.8 FS Fungicide, wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, shoes and socks, goggles and chemical resistant gloves. In addition, wear a suitable dust mask when bagging or sewing bags of treated seed or when transferring seed to a storage bin.
3. Use good personal hygiene, washing hands and exposed skin with warm water and soap before eating, drinking, or smoking. No food, drink or tobacco should be allowed in areas of chemical storage or use.
4. If this pest control product is to be used on a commodity that may be exported to the U.S. and you require information on the acceptable residue levels in the U.S., visit CropLife Canada's website at [www.croplife.ca/](http://www.croplife.ca/).

## GENERAL INFORMATION:

RANCONA® 3.8 FS Fungicide is a seed treatment containing the systemic, broad spectrum fungicide ipconazole. RANCONA 3.8 FS Fungicide provides protection from seed, seedling and soil-borne diseases caused by *Aspergillus* spp., *Cladosporium* spp., *Fusarium* spp., *Penicillium* spp., soil-borne *Rhizoctonia solani*, and *Rhizopus* spp. on field corn, sweet corn and popcorn.

On cereals (including wheat, barley, oats, rye and triticale), RANCONA 3.8 FS Fungicide provides protection from general seed rots (including those caused by saprophytic organisms such as *Penicillium* and *Aspergillus*), seed rots, damping off and seedling blight (seed- and soil-borne *Fusarium*), seed rot and seedling blight (seed- and soil-borne *Cochliobolus sativus*), loose smut, and common bunt, as well as covered smut and leaf stripe of barley.

RANCONA 3.8 FS Fungicide provides control of seed rots, damping-off and seedling blights, and suppression of root rot, caused by soil-borne *Rhizoctonia solani* and *Fusarium* spp. on canola (including canola-quality *Brassica juncea*) and rapeseed. For protection of seeds and emerging canola and rapeseed seedlings only.

## DIRECTIONS FOR USE:

DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

**For corn: RANCONA 3.8 FS Fungicide** is intended ONLY for use by commercial seed treatment applicators. Applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums, totes, kegs), or employ closed mixing/loading equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank) is not permitted in commercial settings.

**For canola and rapeseed: RANCONA 3.8 FS Fungicide** may be applied either on-farm or in commercial seed treatment facilities. Commercial applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums, totes, kegs), or employ closed mixing/loading equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank) is not permitted in commercial settings."

**For cereal grains (wheat, barley, oats, rye and triticale): RANCONA 3.8 FS Fungicide** may be applied either on-farm or in commercial seed treatment facilities. Commercial seed treatment facilities must use closed mixing/loading ONLY.

DO NOT apply by air.

ALWAYS SHAKE OR STIR PRODUCT WELL BEFORE USE

Apply RANCONA 3.8 FS Fungicide using standard seed treatment equipment. Uniform application on seed is necessary to ensure optimum performance. This product must be diluted with water or other treatment products prior to application, and agitated to keep the slurry uniform, to assure uniform seed coverage. Do not tank mix with other products unless compatibility has been confirmed and is used at approved rates and according to all label directions; or is specified on this label. The optimum treating process and slurry composition depends on the crop, the treating process and application conditions. If assistance is required for treating recommendations, contact your Chemtura representative.

CROP	PESTS	APPLICATION RATE (mL RANCONA® 3.8 FS Fungicide per 100 kg seed)	DIRECTIONS
Corn* (field corn, sweet corn and popcorn)	<p><u>Diseases controlled:</u> Seed rot / pre-emergence damping off caused by seed-borne <i>Aspergillus</i> spp., <i>Cladosporium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp. and <i>Rhizopus</i> spp.</p> <p>Seedling blight caused by seed-borne <i>Fusarium</i> spp.</p> <p>Seed rot / pre-emergence damping off and seedling blight caused by soil-borne <i>Fusarium</i> spp.</p> <p>Seed rot/ pre-emergence damping-off caused by soil-borne <i>Rhizoctonia solani</i></p> <p><u>Diseases suppressed:</u> Seed rot / pre-emergence damping-off caused by seed-borne <i>Penicillium</i> spp.</p>	5.6 mL	<p>Use only in treating equipment which can accurately control application rate and provide good distribution of the chemical onto the seed in the mixing chamber.</p> <p>NOT for use in hopper box, slurry-box or similar seed treatment applications.</p> <p>This product contains no dye or colourant. An appropriate seed colourant must be applied.</p> <p>May be applied in a commercial seed treatment facility only.</p>
Wheat* (spring and winter)	<p><u>Diseases Controlled:</u> General seed rots (including those caused by saprophytic organisms such as <i>Penicillium</i> and <i>Aspergillus</i>)</p> <p>Seed rot, damping off and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Fusarium</i>)</p> <p>Seed rot and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Loose Smut (<i>Ustilago tritici</i>)</p> <p>Common Bunt (<i>Tilletia caries</i>, <i>T. foetida</i>)</p> <p><u>Diseases Suppressed:</u> Common root rot (<i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Crown and Foot Rot (<i>Fusarium</i>)</p>	3.3 mL	<p>Use only in treating equipment which can accurately control application rates and provide good distribution of the chemical onto the seed in the mixing chamber.</p> <p>NOT for use in hopper box, slurry-box or similar seed treatment applications.</p> <p>This product contains no dye or colourant. An appropriate seed colourant must be applied.</p>
Barley*	<p><u>Diseases Controlled:</u> General seed rots (including those caused by saprophytic organisms such as <i>Penicillium</i> and <i>Aspergillus</i>)</p> <p>Seed rot, damping off and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Fusarium</i>)</p> <p>Seed rot and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>True Loose Smut (<i>Ustilago nuda</i>)</p> <p>Covered Smut (<i>U. hordei</i>)</p> <p>False Loose Smut (<i>U. nigra</i>)</p> <p>Leaf Stripe (<i>Pyrenophora graminea</i>)</p> <p><u>Diseases Suppressed:</u> Common root rot (<i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Crown and Foot Rot (<i>Fusarium</i>)</p>	3.3 – 4.4 mL	<p>Use only in treating equipment which can accurately control application rates and provide good distribution of the chemical onto the seed in the mixing chamber.</p> <p>NOT for use in hopper box, slurry-box or similar seed treatment applications.</p> <p>This product contains no dye or colourant. An appropriate seed colourant must be applied.</p>
NOTE: The higher rate provides a higher level of true loose smut control. Use the higher rate for highly infected seed lots only.			

CROP	PESTS	APPLICATION RATE (mL RANCONA® 3.8 FS Fungicide per 100 kg seed)	DIRECTIONS
Oats*	<p><u>Diseases Controlled:</u> General seed rots (including those caused by saprophytic organisms such as <i>Penicillium</i> and <i>Aspergillus</i>) Seed rot, damping off and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Fusarium</i>) Seed rot and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Cochliobolus sativus</i>) Loose Smut (<i>Ustilago avenae</i>) Covered Smut (<i>U. kollerii</i>)</p> <p><u>Diseases Suppressed:</u> Common root rot (<i>Cochliobolus sativus</i>) Crown and Foot Rot (<i>Fusarium</i>)</p>	3.3 mL	<p>Use only in treating equipment which can accurately control application rates and provide good distribution of the chemical onto the seed in the mixing chamber.</p> <p>NOT for use in hopper box, slurry-box or similar seed treatment applications.</p> <p>This product contains no dye or colourant. An appropriate seed colourant must be applied.</p>
Rye*, Triticale*	<p><u>Diseases Controlled:</u> General seed rots (including those caused by saprophytic organisms such as <i>Penicillium</i> and <i>Aspergillus</i>) Seed rot, damping off and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Fusarium</i>) Seed rot and seedling blight (seed- and soil-borne <i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p><u>Diseases Suppressed:</u> Common root rot (<i>Cochliobolus sativus</i>) Crown and Foot Rot (<i>Fusarium</i>)</p>	3.3 mL	<p>Use only in treating equipment which can accurately control application rates and provide good distribution of the chemical onto the seed in the mixing chamber.</p> <p>NOT for use in hopper box, slurry-box or similar seed treatment applications.</p> <p>This product contains no dye or colourant. An appropriate seed colourant must be applied.</p>
Canola (including canola-quality <i>Brassica juncea</i> ), Rapeseed	<p><u>Diseases controlled:</u> Seed rots, damping-off and seedling blights caused by soil-borne <i>Rhizoctonia solani</i> and <i>Fusarium</i> spp.</p> <p><u>Diseases suppressed:</u> Root rot caused by soil-borne <i>Rhizoctonia solani</i> and <i>Fusarium</i> spp.</p>	11.1 - 22.2 mL	<p>Use only in treating equipment which can accurately control application rates and provide good distribution of the chemical onto the seed in the mixing chamber.</p> <p>NOT for use in hopper box, slurry-box or similar seed treatment applications.</p> <p>This product contains no dye or colorant. An appropriate seed colourant must be applied.</p>

\*includes grains, forage and silage

#### TANK MIXTURES:

##### For corn (except popcorn):

- For the control of damping-off caused by *Pythium* spp., mix the recommended rate of RANCONA 3.8 FS Fungicide with Allegiance™ FL Seed Treatment Fungicide (PCP 26674) at 6.2 ml/100 kg seed. NOTE: Allegiance™ FL is NOT registered for use on popcorn.
- RANCONA 3.8 FS Fungicide, or RANCONA 3.8 FS Fungicide + Allegiance™ FL Seed Treatment Fungicide, may also be mixed with Poncho® 600 FS (PCP 27453) at label rates for control of the insect pests on the Poncho® 600 FS label.

##### For cereal grains:

- For control of *Pythium*, RANCONA 3.8 FS Fungicide may be tank mixed with Apron XL® LS (PCP 25585) and applied to wheat (spring or winter), barley, oats and rye. Apply RANCONA 3.8 FS Fungicide at the rate recommended in the table above, and apply Apron XL LS at 2.7 ml/100Kg. Dilute with water or other seed treatment products prior to application. This will provide control of *Pythium* in addition to the disease protection provided by RANCONA 3.8 FS Fungicide. Read and follow all additional label precautions and requirements for Apron XL LS.

When used in a tank mix, follow all use directions and the most restrictive precautions and restrictions on the individual product labels.

## APPLICATION CAUTIONS:

1. For corn: RANCONA 3.8FS Fungicide is intended only for use by commercial seed treatment applicators. Applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums, totes, kegs), or employ closed mixing/loading equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank) is not permitted in commercial settings.

For canola and rapeseed: Rancona 3.8 FS Fungicide may be applied either on-farm or in a commercial seed treatment facilities. Commercial applicators may employ transfer/pumping from containers (such as drums, totes, kegs), or employ closed mixing/loading equipment. Open pouring (such as pouring from a jug into a tank) is not permitted in commercial settings.

For cereal grains (wheat, barley, oats, rye and triticale): RANCONA 3.8 FS Fungicide may be applied either on-farm or in commercial seed treatment facilities. Commercial seed treatment facilities must use closed mixing/loading ONLY.

2. COLOURATION OF TREATED SEED: This product contains no colourant. An appropriate colourant must be added when this product is applied to seed. Regulations pertaining to colouration of treated seed enforced under the *Seeds Act* must be strictly adhered to when using this product.
3. SEED QUALITY: Laboratory and field studies have shown that RANCONA 3.8 FS Fungicide applied to corn, cereal grains, canola and rapeseed will not adversely affect germination. RANCONA 3.8 FS Fungicide treated wheat and barley seed may be stored for up to 18 months without reduction in germination due to the treatment chemical.

However, treatment of highly mechanically damaged seed, or seed of known low vigor and poor quality, may result in reduced germination and/or reduction of seed and seedling vigor. Treatment of mechanically scarred or damaged seed, or of seed known to be of low germ, low vigor and poor quality is not recommended. Treat and conduct germination tests on a small portion of seed before committing the total seed lot to a selected chemical treatment. Due to seed quality conditions beyond the control of Chemtura, no claims are made to guarantee germination of carry-over seed.

## USE RESTRICTIONS:

- **For corn:** RANCONA 3.8 FS Fungicide may only be applied by commercial seed treatment applicators. On-farm seed treatment is not permitted.
- **Do not** use treated seed for food, feed or oil processing.
- **Do not** contaminate feed or foodstuffs.
- **Do not** contaminate ponds, lakes or streams.
- **Do not** store treated seed above 25°C or in direct sunlight.
- **Do not** graze or feed livestock on treated areas for 30 days after planting treated cereal seeds.
- Labeling Treated Seed: All bags containing treated seed treated with this product must be labeled or tagged as follows:

"This seed has been treated with RANCONA 3.8 FS Fungicide, which contains ipconazole. DO NOT use for feed, food or oil processing. Store away from feeds and other foodstuffs. Handlers of treated seeds must wear a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves and shoes and socks.."

## RESISTANCE MANAGEMENT RECOMMENDATIONS:

For resistance management, please note that RANCONA 3.8 FS Fungicide contains a Group 3 fungicide. Any fungal population may contain individuals naturally resistant to RANCONA 3.8 FS Fungicide and other Group 3 fungicides. A gradual or total loss of pest control may occur over time if these fungicides are used repeatedly in the same fields. Other resistance mechanisms that are not linked to site of action but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist. Appropriate resistance-management strategies should be followed.

To delay fungicide resistance:

- Where possible, rotate the use of RANCONA 3.8 FS Fungicide or other Group 3 fungicides with different groups that control the same pathogens.
- Use tank mixtures with fungicides from a different group when such use is permitted.
- RANCONA 3.8 FS Fungicide use should be based on an IPM program that includes scouting, historical information related to pesticide use and crop rotation and considers cultural, biological and other chemical control practices.
- Monitor treated fungal populations for resistance development.
- If disease continues to progress after treatment with this product, do not increase the use rate. Discontinue use of this product, and switch to another fungicide with a different target site of action, if available.
- Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or IPM recommendations for specific crops and pathogens.
- For further information or to report suspected resistance contact Chemtura Canada Co./Cie at 1-800-350-1745 or at [www.ChemturaAgroSolutions.com](http://www.ChemturaAgroSolutions.com).

## **STORAGE AND DISPOSAL:**

### STORAGE

To prevent contamination, store this product away from food or feed.

### DISPOSAL

#### **FOR NON-RETURNABLE CONTAINERS:**

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the mixture in the tank.
2. Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer or the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

#### **FOR RECYCLABLE CONTAINERS:**

Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty container unsuitable for further use. If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

#### **FOR RETURNABLE CONTAINERS:**

Do not reuse this container for any purpose. For disposal, this empty container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).

#### **FOR REFILLABLE CONTAINERS:**

For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this container for any other purpose.

**TRIPLE RINSE INSTRUCTIONS (FOR RECYCLABLE AND DISPOSABLE CONTAINERS ONLY):** This container should be triple-rinsed prior to its disposal. The rinsate can be added to the seed treatment. Follow these steps for rinsing of containers:

1. Transfer RANCONA 3.8 FS Fungicide from the container to the seed treating equipment applicator tank.
2. Add 1/3 of the rinse water to the container and agitate the contents.
3. Transfer the rinsate to the applicator tank.
4. Rinse as above 2 more times.
5. Thoroughly mix the RANCONA 3.8 FS Fungicide and rinse water in the applicator tank prior to use.

**CAUTION:** Be sure to adjust the undiluted application rate by the same volume of water added to compensate for the dilution of the product caused by the addition of rinsate.

#### **DISPOSAL OF UNUSED, UNWANTED PRODUCT:**

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

#### **NOTICE TO USER:**

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

®RANCONA and ™Chemtura AgroSolutions are trademarks of Chemtura Canada Co./Cie

™Allegiance and ®Poncho are trademarks of Bayer CropScience.

®Apron XL is a registered trademark of a Syngenta Group Company.

©Copyright 2013, Chemtura Canada Co./Cie

## PRÉCAUTIONS :

### 1. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

- Traitement des semences à la ferme :** Pour mélanger, charger, appliquer ou manipuler le Fongicide pour le traitement des semences **RANCONA 3.8 FS**, l'équipement contaminé ou les semences traitées avec le Fongicide pour le traitement des semences **RANCONA 3.8 FS**, porter une combinaison par-dessus un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes, des gants résistant aux produits chimiques et des lunettes de sécurité. De plus, porter un masque antipoussières approprié pendant l'ensachage ou la couture des sacs de semences traitées, et pendant le transfert des semences dans les cellules de stockage.
- Traitement des semences à l'échelle commerciale :** Pour mélanger, charger, appliquer ou manipuler le Fongicide pour le traitement des semences **RANCONA 3.8 FS**, l'équipement contaminé ou les semences traitées avec le Fongicide pour le traitement des semences **RANCONA 3.8 FS**, porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes, et des gants résistant aux produits chimiques. De plus, porter un masque antipoussières approprié pendant l'ensachage ou la couture des sacs de semences traitées, et pendant le transfert des semences dans les cellules de stockage.
- Pratiquer une bonne hygiène personnelle, se laver les mains ou toute autre partie exposée de la peau à l'eau chaude et au savon avant de manger, de boire ou de fumer. Aucun aliment, boisson ou produit du tabac ne doit se trouver sur les lieux d'entreposage ou d'utilisation du produit.
- Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à [www.croplife.ca/](http://www.croplife.ca/).

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA® 3.8 FS contient de l'ipconazole, un fongicide systémique à large spectre.

Le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS protège des maladies transmises par les semences, les semis et le sol et causées par *Aspergillus* spp., *Cladosporium* spp., *Fusarium* spp., *Penicillium* spp., *Rhizoctonia solani* et *Rhizopus* spp., sur le maïs de plein champ, le maïs sucré et le maïs à éclater.

Pour les grains (incluant le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, et le triticale), Le Fongicide RANCONA 3.8 FS est utilisé pour supprimer des pourritures sèches (y comprise celles sont causées par des organismes saprophytes tels que *Penicillium* et *Aspergillus*), fonte des semis et brûlure des semis (transmis par les semences et le sol et causées par *Fusarium*), and la pourriture des grains et font des semis (transmis par les semences et le sol et causées par *Cochliobolus sativus*), le charbon nu, et la carie sèche, en plus de charbon couvert et strie foliaire d'orge.

Le Fongicide RANCONA 3.8 FS préventif aussi pour supprimer la pourriture de la semence, la fonte des semis, et les brûlures des plantules, et pour réprimer la pourriture de la racine, causées par les pathogènes *Rhizoctonia* et *Fusarium* spp. pour la semence de canola (incluant la *Brassica juncea* de qualité canola) et de colza.

## MODE D'EMPLOI :

NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

**Pour le maïs :** Le fongicide RANCONA 3.8 FS est destiné UNIQUEMENT à son utilisation par des applicateurs commerciaux de traitement pour les semences. Les applicateurs peuvent employer une méthode de transvissage/pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets), ou se servir d'un équipement de mélange/remplissage en circuit fermé. Dans les installations commerciales, il est défendu de le verser à découvert (comme de le transvider à partir d'une cruche dans un réservoir ou une cuve).

**Pour le canola et le colza :** Le fongicide RANCONA 3.8 FS peut être appliqué soit sur la ferme ou bien dans une installation commerciale de traitement pour les semences. Les applicateurs commerciaux peuvent employer une méthode de transvissage/pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets), ou se servir d'un équipement de mélange/remplissage en circuit fermé. Dans les installations commerciales, il est défendu de le verser à découvert (comme de le transvider à partir d'une cruche dans un réservoir ou une cuve).

**Pour les grains céréaliers (blé, orge, avoine, seigle et triticale) :** Le fongicide RANCONA 3.8 FS peut être appliqué soit sur la ferme ou dans une installation commerciale de traitement pour les semences. Les installations commerciales de traitement des semences doivent utiliser UNIQUEMENT un moyen de mélange/remplissage en circuit fermé.

NE PAS appliquer du haut des airs.

## BIEEN AGITER OU REMUER CE PRODUIT AVANT L'EMPLOI

Appliquer le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS en utilisant un système de traitement des semences standard. Une application uniforme sur la semence est essentielle pour assurer une performance optimale. Ce produit doit être dilué avec de l'eau ou d'autres produits de traitement des semences avant son application, il faut l'agiter pour garder la bouillie bien mélangée, afin d'assurer une couverture uniforme. Ne pas le combiner en cuve avec d'autres produits à moins que leur compatibilité ait été confirmée et qu'il soit employé aux doses approuvées et conformément à toutes les directives des étiquettes, ou de la manière stipulée sur cette étiquette. La méthode optimale de traitement et la composition de la bouillie dépendent de la culture à protéger, du procédé de traitement et des conditions d'application. Pour obtenir des recommandations concernant le traitement, communiquer avec le représentant de Chemtura Canada Co./Cie.



Culture	Parasites	Taux d'Application (mL de Fongicide RANCONA® 3.8 FS par 100 kg de semences)	Mode d'Emploi
Maïs* (de grande culture, sucré et à éclater)	<p><b>Maladies supprimées :</b> Pourriture des semences / fonte des semis en prélevée causées par les maladies <i>Aspergillus</i> spp., <i>Cladosporium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp. et <i>Rhizopus</i> spp., transmises par les semences</p> <p>Brûlure des semis causée par la maladie <i>Fusarium</i> spp., transmise par les semences</p> <p>Pourriture de la semence / fonte des semis ou brûlure des semis en prélevée causée par la pathogène <i>Fusarium</i> spp. transmis par le sol</p> <p>Pourriture de la semence / fonte des semis en prélevée causée par la pathogène <i>Rhizoctonia solani</i> transmis par le sol</p> <p><b>Maladies réprimées :</b> Pourriture des semences / fonte des semis en prélevée causées par la maladie <i>Penicillium</i> spp., transmise par les semences.</p>	5,6 mL	<p>Utiliser uniquement avec un système de traitement des semences capable de contrôler avec précision les doses d'application et d'assurer une bonne distribution du produit sur les semences dans la chambre de mélange.</p> <p>NE PAS utiliser dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou tout autre matériel similaire servant au traitement des semences.</p> <p>Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être appliqué sur les semences.</p> <p>Peut être appliqué uniquement dans des installations commerciales de traitement des semences.</p>
Blé* (de printemps et d'hiver)	<p><b>Symptômes réprimés :</b> Pourritures générales des semences (y compris celles qui sont causées par des organismes saprophytes tels que <i>Penicillium</i> et <i>Aspergillus</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, fonte des semis et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Fusarium</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Charbon nu (<i>Ustilago tritici</i>)</p> <p>Carie commune (<i>Tilletia caries</i>, <i>T. foetida</i>)</p> <p><b>Maladies réprimées :</b> Pourriture commune des racines (<i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Pourriture du collet et pourridié (<i>Fusarium</i> spp.)</p>	3,3 mL	<p>Utiliser uniquement avec un système de traitement des semences capable de contrôler avec précision les doses d'application et d'assurer une bonne distribution du produit sur les semences dans la chambre de mélange.</p> <p>NE PAS utiliser dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou tout autre matériel similaire servant au traitement des semences.</p> <p>Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être appliqué sur les semences.</p>
Orge*	<p><b>Symptômes réprimés :</b> Pourritures générales des semences (y compris celles qui sont causées par des organismes saprophytes tels que <i>Penicillium</i> et <i>Aspergillus</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, fonte des semis et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Fusarium</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Vrai charbon nu (<i>Ustilago nuda</i>)</p> <p>Charbon couvert (<i>U. hordei</i>)</p> <p>Faux charbon nu (<i>U. nigra</i>)</p> <p>Strie (<i>Pyrenophora graminea</i>)</p> <p><b>Maladies réprimées :</b> Pourriture commune des racines (<i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Pourriture du collet et pourridié (<i>Fusarium</i>)</p>	3,3 – 4,4 mL	<p>Utiliser uniquement avec un système de traitement des semences capable de contrôler avec précision les doses d'application et d'assurer une bonne distribution du produit sur les semences dans la chambre de mélange.</p> <p>NE PAS utiliser dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou tout autre matériel similaire servant au traitement des semences.</p> <p>Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être appliqué sur les semences.</p>
<p>Note : La dose la plus élevée donne une meilleure suppression du charbon nu. Utiliser la dose plus élevée uniquement pour les lots de semences très infectées.</p>			

Culture	Parasites	Taux d'Application (mL de Fongicide RANCONA® 3.8 FS par 100 kg de semences)	Mode d'Emploi
Avoine*	<p><u>Symptômes réprimés:</u> Pourritures générales des semences (y compris celles qui sont causées par des organismes saprophytes tels que <i>Penicillium</i> et <i>Aspergillus</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, fonte des semis et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Fusarium</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Charbon nu (<i>Ustilago avenae</i>)</p> <p>Charbon couvert (<i>U. kolleri</i>)</p> <p><u>Maladies réprimées :</u> Pourriture commune des racines (<i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Pourriture du collet et pourridié (<i>Fusarium</i>)</p>	3,3 mL	<p>Utiliser uniquement avec un système de traitement des semences capable de contrôler avec précision les doses d'application et d'assurer une bonne distribution du produit sur les semences dans la chambre de mélange.</p> <p>NE PAS utiliser dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou tout autre matériel similaire servant au traitement des semences.</p> <p>Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être appliqué sur les semences.</p>
Seigle*, Triticale*	<p><u>Symptômes réprimés:</u> Pourritures générales des semences (y compris celles qui sont causées par des organismes saprophytes tels que <i>Penicillium</i> et <i>Aspergillus</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, fonte des semis et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Fusarium</i>)</p> <p>Pourriture de la semence, et brûlure des plantules (transmises par la semence ou le sol. comme <i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p><u>Maladies réprimées :</u> Pourriture commune des racines (<i>Cochliobolus sativus</i>)</p> <p>Pourriture du collet et pourridié (<i>Fusarium</i>)</p>	3,3 mL	<p>Utiliser uniquement avec un système de traitement des semences capable de contrôler avec précision les doses d'application et d'assurer une bonne distribution du produit sur les semences dans la chambre de mélange.</p> <p>NE PAS utiliser dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou tout autre matériel similaire servant au traitement des semences.</p> <p>Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être appliqué sur les semences.</p>
Canola (incluant la <i>Brassica juncea</i> de qualité canola), Colza	<p><u>Maladies supprimées :</u> La pourriture de la semence, la fonte des semis et les brûlures des plantules causées par les pathogènes <i>Rhizoctonia</i> et <i>Fusarium</i> spp.</p> <p><u>Maladies réprimées :</u> La pourriture de la racine causée par les pathogènes <i>Rhizoctonia</i> et <i>Fusarium</i> spp.</p>	11,1 – 22,2 mL	<p>Utiliser uniquement avec un système de traitement des semences capable de contrôler avec précision les doses d'application et d'assurer une bonne distribution du produit sur les semences dans la chambre de mélange.</p> <p>NE PAS utiliser dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou tout autre matériel similaire servant au traitement des semences.</p> <p>Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être appliqué sur les semences.</p>

\*y compris les grains, le fourrage, et l'ensilage

## MÉLANGES EN CUVE :

### Sur le maïs (excepté le maïs à éclater) :

- Pour supprimer la fonte des semis causée par *Pythium* spp., mélanger la dose recommandée de Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS avec 6,2 mL de Fongicide pour le traitement des semences Allegiance™ FL (PCP 26674) par 100 kg de semences. L'utilisation du Fongicide pour le traitement des semences Allegiance FL N'EST PAS homologuée pour le maïs à éclater.
- RANCONA 3.8 FS, ou RANCONA 3.8 FS + Allegiance FL, peuvent également être mélangés avec Poncho® 600 FS (PCP 27453) aux doses indiquées sur l'étiquette pour supprimer les insectes mentionnés sur l'étiquette de Poncho 600 FS.

### Sur les céréales :

- Pour la suppression des pathogènes à *Pythium*, le fongicide RANCONA 3.8 FS peut être mélangé en cuve avec Apron XL®LS (numéro d'homologation 25585) puis appliqué sur le blé (de printemps ou d'hiver), l'orge, l'avoine et le seigle.
- Appliquer le fongicide RANCONA 3.8 FS à n'importe quelle dose recommandée dans le tableau ci-dessus, et appliquer Apron XL LS à raison de 2,7 mL par 100 kg. Diluer avec de l'eau ou d'autres produits de traitement des semences avant l'application. Ce mélange permettra de supprimer le *Pythium*, en plus d'offrir la protection contre les maladies que fournit le fongicide RANCONA 3.8 FS. Lire et respecter toutes les précautions et exigences additionnelles stipulées sur l'étiquette d'Apron XL LS.

Lorsqu'un mélange en cuve est utilisé, suivre le mode d'emploi ainsi que les précautions les plus restrictives énoncées sur l'étiquette de chaque produit.

## PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE D'APPLICATION :

1. **Pour le maïs : Le fongicide RANCONA 3.8 FS** est destiné UNIQUEMENT à son utilisation par des applicateurs commerciaux de traitement pour les semences. Les applicateurs peuvent employer une méthode de transvissage/pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets), ou se servir d'un équipement de mélange/remplissage en circuit fermé. Dans les installations commerciales, il est défendu de le verser à découvert (comme de le transvider à partir d'une cruche dans un réservoir ou une cuve).  
**Pour le canola et le colza : Le fongicide RANCONA 3.8 FS** peut être appliqué soit sur la ferme ou bien dans une installation commerciale de traitement pour les semences. Les applicateurs commerciaux peuvent employer une méthode de transvissage/pompage à partir des contenants (tels que barils, réservoirs portatifs, tonnelets), ou se servir d'un équipement de mélange/remplissage en circuit fermé. Dans les installations commerciales, il est défendu de le verser à découvert (comme de le transvider à partir d'une cruche dans un réservoir ou une cuve).  
**Pour les grains céréaliers (blé, orge, avoine, seigle et triticale) : Le fongicide RANCONA 3.8 FS** peut être appliqué soit sur la ferme ou dans une installation commerciale de traitement pour les semences. Les installations commerciales de traitement des semences doivent utiliser UNIQUEMENT un moyen de mélange/remplissage en circuit fermé.
2. **COLORATION DES SEMENCES TRAITÉES :** Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant approprié doit être ajouté lorsque ce produit est appliqué sur les semences. Le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS est destiné aux installations commerciales de traitement de semences. La réglementation relative à la coloration des semences traitées qui s'applique en vertu de la *Loi sur les semences* doit être suivie à la lettre lorsqu'on utilise ce produit.
3. **QUALITÉ DES SEMENCES :** Des études en laboratoire et sur le terrain ont montré que le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS appliqué sur le maïs, les céréales, le canola et le colza n'a pas d'effets nocifs sur la germination. Le traitement de semences très endommagées par de l'équipement, ou de semences d'une vigueur et d'une qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur des semences et des plantules. Le traitement de semences fortement endommagées ou rayées par la machinerie, ou encore de semences considérées de faible vigueur ou de qualité inférieure n'est pas recommandé. Traiter et faire des tests de germination sur une petite partie du lot avant d'utiliser un produit agrochimique pour traiter tout le lot. Comme la qualité des semences est liée à des conditions indépendantes de la volonté de Chemtura Canada Co./Cie, la société ne garantit pas la germination des semences mises de côté pour l'année suivante.

## RESTRICTIONS D'EMPLOI :

- **Pour maïs :** Fongicide Rancona 3.8 FS est destiné pour le traitement des semences de maïs par des enrobeurs de semences commerciaux seulement. Ne pas utiliser dans l'équipement non industriel servant au traitement des semences (équipement de traitement à la ferme, p.ex.).
- **Ne pas** utiliser la semence traitée pour l'alimentation humaine ou animale ou pour la transformation en huile.
- **Ne pas** contaminer les aliments pour animaux, ni les denrées alimentaires.
- **Ne pas** contaminer les étangs, les lacs ou les cours d'eau.
- **Ne pas** entreposer à plus de 25°C ou à la lumière directe du soleil.
- Céréales : **Ne pas** faire paître ou nourrir le bétail avec les plantes des endroits traités moins de 30 jours après le semis.
- **ÉTIQUETAGE DES SEMENCES TRAITÉES :** Tout sac contenant des semences traitées doit porter une étiquette mentionnant l'avertissement suivant :  
« Ces semences ont été traitées avec le Fongicide pour le traitement des semences **RANCONA 3.8 FS**, qui contient de l'ipconazole. NE PAS utiliser pour la préparation d'aliments ou d'huile destinés à l'alimentation humaine ou animale. Entreposer à l'écart de toute denrée de consommation humaine ou animale. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures et des chaussettes quand on manipule des semences traitées.»

## RECOMMANDATIONS SUR LA MATIÈRE DE GESTION DE LA RÉSISTANCE :

Aux fins de la gestion de la résistance, le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS contient un fongicide du Groupe 3. Toute population de champignons peut renfermer des individus naturellement résistants à RANCONA 3.8 FS et à d'autres fongicides du Groupe 3. Il peut se produire une perte progressive ou complète du degré d'éradication si ces fongicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un

métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder la résistance aux fongicides :

- Dans la mesure du possible, utiliser RANCONA 3.8 FS ou les autres fongicides du Groupe 3 en alternance avec des fongicides de groupes différents, capables d'éradiquer les mêmes organismes pathogènes.
- Utiliser des mélanges en réservoir comprenant un fongicide d'un groupe différent, lorsqu'un tel usage est permis.
- RANCONA 3.8 FS doit être utilisé en suivant un programme de gestion intégrée des parasites (GIP) qui prévoit le dépistage et la tenue de dossiers relatifs à l'utilisation des pesticides et à la rotation des cultures et envisage des pratiques culturales, biologiques et autres méthodes d'éradication chimiques.
- Contrôler les populations fongiques traitées afin de déceler toute manifestation de résistance.
- Lorsque la maladie continue de progresser après le traitement avec ce produit, ne pas augmenter la quantité utilisée. Cesser d'employer le produit et passer à un autre fongicide ayant un site ou un mode d'action différent, si possible.
- Communiquer avec le spécialiste agricole de la région ou avec des conseillers agricoles agréés pour obtenir d'autres recommandations en matière de gestion de la résistance aux pesticides et de GIP, relativement au site traité ou aux problèmes d'infestation dans la région.
- Pour d'autres renseignements ou pour signaler d'éventuels cas de résistance, communiquer avec Chemtura Canada Co./Cie au 1-800-350-1745 ou à [www.ChemturaAgroSolutions.com](http://www.ChemturaAgroSolutions.com).

## **ENTREPOSAGE ET ELIMINATION :**

### **ENTREPOSAGE :**

Pour prévenir la contamination, entreposer ce produit à l'écart de la nourriture de consommation humaine et animale.

### **ELIMINATION :**

#### **CONTENANTS NON RÉUTILISABLES :**

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

#### **CONTENANTS RECYCLABLES :**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable. S'il n'y a pas de site de collecte dans la région, éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales.

#### **CONTENANTS RÉUTILISABLES :**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

#### **CONTENANTS À REMPLISSAGES MULTIPLES :**

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins.

**INSTRUCTIONS SUR LE TRIPLE RINÇAGE (POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES ET JETABLES SEULEMENT) :** Il est important de rincer ce contenant trois fois avant de le jeter. Le rinçat, ou eau de rinçage, peut être ajouté au produit de traitement de semences. Procéder comme suit pour rincer les contenants :

1. Verser le contenant de Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS dans le réservoir du système de traitement des semences.
2. Verser le tiers du rinçat dans le contenant et agiter le contenu.
3. Transférer le rinçat dans le réservoir du système de traitement des semences.
4. Répéter l'opération de rinçage deux autres fois.
5. Mélanger à fond le Fongicide pour le traitement des semences RANCONA 3.8 FS et le rinçat avant l'emploi.

**ATTENTION :** S'assurer d'ajuster le taux d'application du produit non dilué en fonction du volume d'eau correspondant ajouté, afin de compenser la dilution du produit résultant de l'ajout du rinçat.

#### **ÉLIMINATION DU PRODUIT NON UTILISÉ OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR :**

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

#### **AVIS À L'UTILISATEUR :**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les Produits Antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

RANCONA® et Chemtura AgroSolutions™ sont des marques de Chemtura Canada Co./Cie

Alliance™ et Poncho® sont des marques de Bayer CropScience

Apron XL® est de la marque déposée de Syngenta

©Copyright 2013, Chemtura Canada Co./Cie

IMPORTANT: ALWAYS SHAKE OR STIR  
PRODUCT WELL BEFORE USE

GROUP 3 FUNGICIDE

IMPORTANT : BIEN AGITER OU REMUER  
CE PRODUIT AVANT L'EMPLOI

FONGICIDE 3 GROUPE

# RANCONA® 3.8 FS Fungicide

## Seed Treatment Fungicide

RANCONA® 3.8 FS Fungicide Seed Treatment provides protection from seed, seedling and soil-borne diseases caused by the listed organisms on field corn; sweet corn; popcorn; cereal grains (including wheat, barley, oats, rye and triticale); canola (including canola-quality *Brassica juncea*) and rapeseed.

This product contains no colourant. An appropriate colourant must be added when this product is applied. Regulations pertaining to colouration of treated seed under the *Seeds Act* must be strictly adhered to when using this product.

SUSPENSION  
AGRICULTURAL

GUARANTEE: Ipcnazole ..... 450 g/L

REGISTRATION NO. 29175, PEST CONTROL PRODUCTS ACT

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING

PROTECT FROM FREEZING

Le Fongicide RANCONA® 3.8 FS protège des maladies transmises par les semences, les semis et le sol et causées par les organismes mentionnés sur le maïs de plein champ, le maïs sucré et le maïs à éclater; les céréales (y compris le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, et le triticale); et le colza (y compris la *Brassica juncea* de qualité canola), et le colza.

Ce produit ne contient aucun colorant. Lorsqu'on applique ce produit, il faut y ajouter un colorant approprié. Quand on utilise ce produit, les règlements concernant la coloration des semences traitées, aux termes de la *Loi sur les semences*, doivent être strictement respectés.

SUSPENSION  
AGRICOLE

GARANTIE : ipconazole ..... 450 g/L

N° D'HOMOLOGATION 29175,  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES  
**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTES**

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L'UTILISATION

PROTÉGER DU GEL

#### FIRST AID:

**IF SWALLOWED:** Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

**IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin IMMEDIATELY with plenty of water for 15 to 20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take the container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

#### TOXICOLOGICAL INFORMATION:

There is no specific antidote if this product is ingested. Treat symptomatically.

This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia.

#### ENVIRONMENTAL HAZARDS:

Treated seed is toxic to birds and small wild mammals. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.

#### PREMIERS SOINS :

**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **AUCUN** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

#### RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Il n'existe pas d'antidote spécifique en cas d'ingestion. Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.

#### RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :

Les semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et les petits animaux sauvages. Toutes les semences traitées qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être enfouies dans le sol ou ramassées.

Manufactured for:  
**Chemtura Canada Co./Cie**  
25 Erb Street  
Elmira, Ontario N3B 3A3

Fabrique pour :  
**Chemtura Canada Co./Cie**  
25, rue Erb  
Elmira, ON N3B 3A3

www.ChemturaAgroSolutions.com

  
AGROSOLUTIONS™  
003/121812  
SAP#522565 003 (0613)

**Net Contents: 10 liters**