

ORTHO®

Kills **150**
listed
insects

BUG B GON® MAX™

LAWN & GARDEN INSECT KILLER₁

Concentrate

MATA INSECTOS PARA CESPED Y JARDIN

FLEAS

TICKS

ANTS

APHIDS

BEETLES

**Kills
on Contact
Guaranteed[†]**

Kills aphids, mites, caterpillars, beetles, whiteflies, sod webworms, chinch bugs, mole crickets, ants, fleas, ticks, & mosquitoes.

Active Ingredient

Bifenthrin* 0.3%

Other Ingredients ... 99.7%

100.0%

*Cis isomers 97% minimum,
trans isomers 3% maximum

LF080705040

**KEEP OUT
OF REACH
OF CHILDREN**
CAUTION

SEE BACK PANEL BOOKLET FOR
ADDITIONAL PRECAUTIONARY
STATEMENTS.

**MANTENER FUERA
DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**
PRECAUCION


VER EL PANEL POSTERIOR PARA
AVISOS DE PRECAUCION
ADICIONALES.

Use on lawns, around home perimeter, ornamentals, flowers, trees, shrubs, vegetables & fruit trees.

**FOR RESIDENTIAL
OUTDOOR USE ONLY**



**NET/NETO 32 FL OZ
(1 QT) 946 mL**

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION**

ALMACENAMIENTO: Evite que se congele. Mantenga los pesticidas en su envase original. No lo ponga en envases de comida o de bebidas. Evite la contaminación de comestibles y alimentos para animales. Almacenar en un lugar fresco, seco, preferiblemente en un área de almacenamiento bajo llave.

ELIMINACION: Si está vacío: Envase no rellenable. No vuelva a utilizar o llenar este envase. Tirelo a la basura o, si está disponible, oférelo para reciclaje.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCION**RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS**

PRECAUCION: No aplique este producto a humanos o a animales.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se traga: Llame inmediatamente al centro de control de envenenamiento o al doctor para obtener recomendaciones de tratamiento. Haga que la persona tome sorbos de un vaso con agua, si puede tragar. No induzca el vomito a menos que lo indique un centro de control de envenenamientos o el doctor. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente. **Si se inhala:** Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira llame al 911 o a una ambulancia, luego dé respiración artificial, preferible de boca a boca, si es posible. Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para obtener recomendaciones adicionales de tratamiento. **Si cae en la piel o ropa:** Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con mucha agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para obtener más recomendaciones de tratamiento. **Si entra en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua desplazamiento y con cuidado por 15-20 minutos. Si tuviera lentes de contacto, quitelos después de lavarse con agua los primeros 5 minutos y después continúe lavando el ojo. Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para obtener más recomendaciones de tratamiento.

Tenga a la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamiento o al doctor, o al buscar tratamiento. **Nota para el médico:** Información de Emergencia llamar al 1-800-225-2883.


RIESGOS AMBIENTALES: Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discurra a desagües de tormenta, zanjas de drenaje, canales o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación en la zona tratada evitara que el producto discurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje. El desplazamiento o el escorrentimiento del producto de las zonas tratadas pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos de las áreas vecinas. El producto se debe aplicar con cuidado para no afectar a los peces y a las mascotas reptiles que se encuentran dentro o cerca de los estanques ornamentales.

Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento de manera directa o a los residuos de plantas florecientes. No aplique este producto ni permita que entre en contacto con las plantas floríferas si las abejas visitan las zonas de tratamiento. **RIESGOS FISICOS O QUIMICOS:** No aplique este producto en o sobre equipo eléctrico debido a la posibilidad de peligro de choque eléctrico.

NOTA: En forma consistente con la ley aplicable, el comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.

LA GARANTIA ORTHO: Si por cualquier razón usted, el consumidor, no está satisfecho con este producto, envíenos por correo el comprobante original de venta para recibir un reembolso total del precio de compra.

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions
Español ver
página 6



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Do not water the treated area to the point of run-off. Do not make applications during rain.

All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses: Treatment to soil or vegetation around structures; Applications to lawns, turf, and other vegetation; Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet.

Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications, only.

Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

1 Tablespoon (Tbs) = 3 teaspoons (tsp) 1 fl oz = 2 Tbs 4 fl oz = 1/2 cup

Food utensils such as spoons and measuring cups must not be used for food purposes after use with pesticides.

SHAKE WELL**ROSES, FLOWERS, SHRUBS, & SMALL [NON-FRUIT BEARING] TREES****KILLS INSECTS**

Aphids, armyworms, bagworms, crickets, cutworms, Eastern spruce gall adelgade, elm leafbeetles, European pine sawfly, fall webworm, flea beetle, grasshoppers, greenbug aphids, gypsy moth, hornets, Japanese beetle (adults), lacebug, leafhopper, loopers, lygus bug, mealybugs, mimosa webworms, mosquitoes, northern pine weevil, oak webworm, orchard weevil, periodical cicada, pine chaffer, pine shoot weevil, plantbug, redheaded pine sawfly, saltmarsh caterpillar, sap beetle, sawfly, spittlebug, spruce mites, stink bug, tarnished plant bug, tent caterpillar, thrips, two-spotted spider mite, wasp, whitefly, and Zimmerman pine moth.

AMOUNT TO USE**When using a tank sprayer**

1.5 fl oz (3 Tbs) per gallon of water. Spray plants until thoroughly covered.

When using the Ortho® Dial 'N Spray® applicator

1. Set dial to 1.5 fl oz.
2. Pour product into jar to full or one-half full.
3. **DO NOT** add water.
4. Attach hose to the sprayer.
5. Spray evenly on plants.
6. Unused product must be poured back into its original container.

**HOW TO APPLY**

- Spray to uniformly cover upper and lower leaf surfaces, stems, and branches.
- When treating potted plants also lightly spray the soil surface.
- Spray when air is calm to avoid drift. Apply as necessary, waiting 7 to 14 days between each application. Hard to control insects may require 2 to 3 applications.
- If temperature is expected to exceed 85°F, spray in early morning or late afternoon when it is cooler.
- Mosquitoes coming to rest on treated areas will be killed for varying periods of time after application, depending on exposure of treated areas to weather conditions.

MATA INSECTOS (continúa)

Carpophilus, barrenador del maíz del suroeste, chinche de la calabaza, barrenador de la guía de la calabaza, barrenador del tallo, chinches hediondas, chinche lygus, minador tentiform de hojas, gusano del cuero del tabaco, gusano del fruto del tomate, gusano del cuero del tomate, gusano alfiler, pollina copetuda de la manzana, minador de hojas de vegetales, oruga de las leguminosas, leafroller variegado, pulgón de nuez, mosca de la cáscara de nuez, gorgojos, gusano cortador del frijol occidental y mosca blanca.

CANTIDAD A USAR**Cuando use un tanque rociador.**

• Mezcle 44 ml en 3.8 litros de agua.

Cuando use el aplicador Ortho® Dial 'N Spray®

1. Coloque el disco selector en 1.5 fl oz (44 ml).
2. Vierta el producto en el bote a llenar o medio lleno.
3. **NO** agregue agua.
4. Conecte la manguera al rociador.

5. El producto que no se utilice debe vertirse de regreso en el envase original.

CUANDO APlicAR

- Aplique al primer indicio de insectos.
- Vuelva a aplicar cuanto sea necesario para mantener el control esperando por lo menos 7 días entre cada aplicación.

COMO APlicAR

- Aplique rociando completamente, mojando las hojas y ramas, sin dejar que ocurra goteo excesivo.
- Asegúrese de seguir las limitaciones importantes para las plantas comestibles específicas que esté rociando, incluyendo la cantidad de spray que puede aplicarse, el intervalo entre rociadas y la cantidad de días que debe esperarse antes de cosechar.

VEGETALES Y FRUTAS	DIAS DE ESPERA PARA COSECHAR	DIAS DE ESPERA PARA COSECHAR EN CALIFORNIA
Maíz (maíz dulce)	1	18
Tomates	1	No usar
Cítricos	1	No usar
Zarzamoras, Frambuesas	3	4
Habas	3	9
Guisantes (anejas, arveja china, sugar snap), frijoles (judía verde, frijolillo), frijol de ojo negro	3	No usar
Chayote, pepino, calabazas comestibles, melón Cantaloupe, Casaba, melón Honeydew, guícor, calabacín, calabaza del invierno (Butternut, calabaza bellota, calabaza espagueti), sandía	3	3
Mostaza china	7	No usar
Brócoli, brócoli chino, repollo, coliflor, berenjena	7	7
Cabeza de lechuga, pimientos (chile pimiento dulce y/o dulce), alcachofa	7	No usar
Peras	14	No usar
Pecanas	21	No usar

CANTIDAD A USAR**Cuando use un tanque rociador**

- Mezcle 22 a 44 ml (1.5 a 3 Cdas) por 3.8 litros de agua para rociar 12 metros cuadrados.

Cuando use el aplicador Ortho® Dial 'N Spray®

1. Coloque el disco selector en 1.5 fl oz (44 ml).

2. Agregue 177 ml al bote del rociador.

3. **NO** agregue agua.

4. Conecte la manguera al rociador.

5. Rocíe uniformemente sobre 46 a 93 metros cuadrados hasta que el bote esté vacío.

6. El producto que no se utilice debe vertérse de regreso en el envase original.

**COMO APlicar**

- Mida el césped. Calcule los metros cuadrados multiplicando la longitud por el ancho.

- Rocíe uniformemente sobre el área medida. Trate todo el césped.

- **Insectos difíciles de controlar:** Para controlar las hormigas carpinteras rocíe 44 ml por 3.8 litros uniformemente sobre 6 metros cuadrados.

- Los mosquitos que permanezcan en las áreas tratadas serán eliminados por períodos variables de tiempo después de la aplicación, dependiendo de la exposición de las áreas tratadas a las condiciones climáticas.

CUANDO CORTAR Y REGAR

- Aplique al césped que ha sido cortado y regado en las últimas 24 horas.

- Puede cortar el césped nuevamente después de 2 a 3 días.

- Para el control del grillo-topo hay que regar completamente después de la aplicación.

CUANDO VOLVER A APlicar

Espere de 4 a 6 semanas entre aplicaciones.

JARDINES DE HORTALIZAS CASERAS, MELONES Y ARBOLES FRUTALES**MATA INSECTOS:** Áfidos, gusano de la alfalfa, gusano medidor del frijol, picudo cobrizo americano de la chueca, áfido del manzano, mosca de la manzana, oruga negra, polilla de los penachos de la alcachofa, oruga negra de la remolacha, pulgón de cerezas negras, gorgojo de parra negra, gusano del palmo de arándano, pulgón de la cholla, falso medidor de la col, gorgojo de la zanahoria, gusano medidor del apio, mosca de las cerezas, chinches de los cereales, araña café, polilla de los bacalao pequeño, escarabajo de papa de Colorado, gusano de la bellota, adultos del curculionido de la arveja, gusano de la raíz del maíz, adultos de mosca del maíz, curculionido de la arveja, gusano de fruta de arándanos, pulgón del arándano, grillos, adultos del escarabajo mandado y escarabajo rayado del pepino, gusanos cortadores, palomilla dorso de diamante, saltamontes, gusano verde del trébol, gusano verde de fruta, gusano desvatinador de la nuez americana, gusano de la col importado, chinche encáje, saltarilla, gusano menor perforador del duraznero, gusano medidor, chinche lygus, conchuelas del frijol, gusano de naranja naval, leatoller oblicuo-congregado, polilla de fruta oriental, vanesa de los cardos, pulgón del chicharo, gorgojo de chicharo, barrenador del árbol de melocotón, barrenador de ramilla de melocotón, portador de la pecana, afñorfa de pecana, phylloxera del tallo, chicharrilla de las peras, pulgón de la pecana, gorgojo de la pecana, barrenillo del chile, barrenador del fruto de las cítricáceas, insecto de la planta, gorgojo del ciruelo, chicharrita, psílido de la papa, polilla de la papa, leafroller de bandas rojas, gusano de fuego rayado, gusanos de la cáspara, áfido rosado de la manzana, gusano peludo, escama de fruta de San José, escarabajo (continua)
AROUND HOUSE FOUNDATIONS, PORCHES, PATIOS & STORED LUMBER**DO NOT TREAT FIREWOOD**
KILLS INSECTS

Ants (including carpenter ant, Lasius, Argentine, red harvester, pavement, odorous, pyramid, pharaoh), centipedes, cockroaches (including American, Asian, German), crickets, earwigs, fleas, house flies, millipedes, mosquitoes, palmetto bugs, scorpions, sowbugs, spiders, and ticks (including American, deer tick, brown dog tick).

AMOUNT TO USE**When using a tank sprayer**

- 1.5 fl oz (3 Tbs) per gallon of water to be sprayed over 16 linear feet (65 sq ft)

When using the Ortho® Dial 'N Spray® applicator

1. Set dial to 1.5 fl oz.
2. Add 6 fl oz to sprayer jar.
3. **DO NOT** add water.
4. Attach hose to the sprayer.
5. Spray evenly over 64 linear feet (or 260 sq ft) until jar is empty.
6. Unused product must be poured back into its original container.

HOW TO APPLY

- To keep insects from entering the house, use a hose-end or tank sprayer to spray a 2 foot band of soil around the house next to the foundation. Also spray the foundation of the house to a height of 2 feet.
- Repeat application every 14 days if necessary.

LAWN INSECTS**KILLS INSECTS**

Ants (including carpenter, lawn and Argentine), armyworms, black turfgrass ataenius, chinch bugs, crickets, cutworms, deer ticks, fleas, greenbugs (aphids), Japanese beetles (adults), mole crickets, mosquitoes, sod webworms, weevils (including billbugs and annual bluegrass).

AMOUNT TO USE**When using a tank sprayer**

- Mix 0.75 to 1.5 fl oz (1.5 to 3 Tbs) into a gallon of water to be sprayed over 125 sq ft.

When using the Ortho® Dial 'N Spray® applicator

1. Set dial to 1.5 fl oz.
2. Add 6 fl oz to sprayer jar.
3. **DO NOT** add water.
4. Attach hose to the sprayer.
5. Spray evenly over 500 to 1,000 sq ft until jar is empty.
6. Unused product must be poured back into its original container.

HOW TO APPLY

- Measure lawn. Calculate square feet by multiplying length times width.
- Spray evenly over measured area. Treat entire lawn.
- **Tough to Control Insects:** To control carpenter ants spray 1.5 fl oz per gallon evenly over 65 sq ft.
- Mosquitoes coming to rest on treated areas will be killed for varying periods of time after application, depending on exposure of treated areas to weather conditions.

WHEN TO MOW & WATER

- Apply to lawn that was mowed and watered within the last 24 hours. Mowing may be resumed after 2-3 days.
- For mole cricket control, water thoroughly immediately after application.

WHEN TO RE-APPLY

- Wait 4 to 6 weeks between applications.

HOME VEGETABLE GARDENS, MELONS & FRUIT TREES**KILLS INSECTS**

Aphids, alfalfa caterpillar, alfalfa looper, American plum borer, apple aphid, apple maggot, armyworms, artichoke plume moth, beet armyworm, black cherry aphid, black vine weevil, blueberry spanworm, buckhorn aphid, cabbage loopers, carrot weevil, celery looper, cherry fruit fly, chinch bug, clover mites, codling moth, Colorado potato beetle, corn earworm, corn rootworm (adults), corn silkfly (adult), cow pea curculio, cranberry fruitworm, cranberry weevil, crickets, spotted and striped cucumber beetle (adults), cutworms, diamondback moth, European corn borer, fall webworm, filbert worm, flea beetle, grasshoppers, green cloverworm, green fruitworm, hickory shuckworm, imported cabbageworm, lacebug, leafhopper, leafrollers, lesser peach tree borer, loopers, lygus bug, Mexican bean beetle, navel orangeworm, oblique banded leafroller, oriental fruit moth, painted lady caterpillar, pea aphid, pecan nut casebearer, pecan aphid, pecan leaf phylloxera, pecan stem phylloxera, pear psylla, pecan aphid, pecan weevil, pepper weevil, pickleworm, plantbug, plum curculio, potato leafhopper, potato psyllid, potato tuberworm, red-banded leafroller, red striped fireworm, rindworm, rosy apple aphid, saltmarsh caterpillar, San Jose scale (fruit only), sap beetle, southwestern corn borer, squash bug, squash vine borer, stalk borer, stink bug, tarnished plant bug, tentiform leaf miner, tobacco hornworm, tomato fruitworm, tomato hornworm, tomato pinworm, tufted apple budmoth, vegetable leafminer, velvetbean caterpillar, variegated leafroller, walnut aphid, walnut husk fly, weevils, western bean cutworm, and whitefly.

AMOUNT TO USE**When using a tank sprayer**

- Mix 1.5 fl oz into a gallon of water.

When using the Ortho® Dial 'N Spray® applicator

1. Set dial to 1.5 fl oz.
2. Pour product into jar to full or one-half full.
3. **DO NOT** add water.
4. Attach hose to the sprayer.
5. Unused product must be poured back into its original container.

WHEN TO APPLY

- Apply when insects first appear.
- Re-apply as necessary to maintain control waiting at least 7 days between each application.

COMO APlicar

- Rocíe para cubrir de manera uniforme las superficies superior e inferior de las hojas, tallos y ramas. Al tratar plantas en macetas también rocíe ligeramente la superficie de la tierra.
- Rocíe cuando el aire está tranquilo para evitar la deriva. Aplique cuando sea necesario, esperando de 7 a 14 días entre cada aplicación. Los insectos difíciles de controlar pueden necesitar de 2 a 3 aplicaciones.
- Si se espera que la temperatura exceda los 85°F, rocíe temprano en la mañana o al final de la tarde cuando está más fresco.
- Los mosquitos que permanecen en las áreas tratadas serán eliminados por períodos variables de tiempo después de la aplicación, dependiendo de la exposición de las áreas tratadas a las condiciones climáticas.

ALREDEDOR DE LOS CIMENTOS DE LA CASA, PORCHES, PATIOS Y MADERA ALMACENADA**NO TRATE LA LEÑA****MATA INSECTOS**

Hormigas (incluyendo la carpintera, Lasius, argentina, roja recolectora, del pavimento, olorosa, pirámide, faraona), ciempiés, cucarachas (incluyendo la americana asiática, alemana), grillos, tijeretas, pulgas, moscas, milpiés, mosquitos, insecto de Palmetto, escorpiones, cochinillas, arañas y garapatas (incluyendo la americana, garapata de los venados, garapata, café del perro).

CANTIDAD A USAR**Cuando use un tanque rociador**

- 44 ml (3 Cdas) por 3.8 litros de agua para rociar sobre 5 metros lineares (6 metros cuadrados).
- Cuando use el aplicador Ortho® Dial 'N Spray®**
 1. Coloque el disco selector dial en 44 ml.
 2. Agregue 1/7 ml al bote del rociador.
 3. **NO** agregue agua.
 4. Conecte la manguera al rociador.
 5. Rocíe uniformemente sobre 20 metros lineares (o 24 metros cuadrados) hasta que el bote esté vacío.
 6. El producto que no se utilice debe vertérse de regreso en el envase original.

COMO APlicar

- Para evitar que los insectos entren en la casa, use un aplicador de manguera o tanque rociador para rociar una franja de tierra de 0.6 metros alrededor de la casa cerca de los cimientos. También rocíe los cimientos de la casa hasta una altura de 0.6 metros.
- Repita la aplicación cada 14 días, si es necesario.

INSECTOS DE CESPED**MATA INSECTOS**

Hormigas (incluyendo la carpintera, de césped y argentinas), oruga negra, spretulus de ataenius, chinches, grillos, gusanos cortadores, garapatas de venado, pulgas, escarabajo verde (áfidos), escarabajo japonés (adulto), grillo-topo, mosquitos, gusano peludo del césped, gorgojos (incluyendo gorgojos de los géneros Calendra y Sitophilus y los anuales del pasto azul).

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación a la ley Federal usar este producto de forma inconsistente con su etiqueta.

No riegue el área tratada hasta el punto que gotee. No realice aplicaciones cuando llueva.

Todas las aplicaciones para exteriores deben limitarse a tratamientos de lugares específicos, grietas y hendiduras únicamente, excepto para los siguientes usos permitidos: tratamiento para tierra o vegetación alrededor de estructuras; aplicaciones para césped, gramia y otra vegetación; y aplicaciones para cimientos de construcción hasta una altura máxima de 1 metro.

A menos que sean para cimientos de construcción, todas las aplicaciones en exteriores para superficies impermeables, como aceras, canarios de entrada, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) están limitadas a tratamientos focalizados, grietas y hendiduras únicamente.

Se prohíbe la aplicación directa en alcantarillas o desagües, o en cualquier área similar a un canalón donde se pueda producir el drenaje hacia alcantarillas, desagües de tormenta, cuerpos de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto ingrese en ningún desagüe durante ni después de la aplicación.

1 Cucharadita (Cda) = 3 cucharaditas (Cdta) 30 ml = 2 Cda 118 ml = 1/2 taza

Los utensilios para comida tales como cuchillas y tazas medidoras no deben utilizarse para alimentos después de haberlos utilizado con pesticidas.

AGITE BIEN

ROSAS, FLORES, ARBUSTOS Y ÁRBOLES (NO FRUTALES) PEQUEÑOS

MATA INSECTOS

Áfidos, oruga negra, oruga de balsón, grillos, oruga podadera, pulgón irritante de la pieña del este, escarabajos de las hojas del olmo, falsa oruga del pino europeo, gusano de bolsa, pulguilla, saltamontes, áfidos de escarabajo verde, limantria, avispones, escarabajo japonés (adultos), chinche de encaje, saltahojas, gusano medidor, chinche Lygus, cochimilla harinosa, escarabajo Carpopophilus, oruga mimosa, mosquitos, gorjojo de pino del norte, oruga de roble, gorjojo del huerto, chicharras, gusano blanco del pino, mariposa del brote del pino, insecto de la planta, deltidador de pinos de cabeza roja, áfrófora, ácaro de pieñas, chinches hediondas, chinche lygus, gusano telanároso, ácaro rojo, avispa, mosca blanca y polilla de pino Zimmerman.

CANTIDAD A USAR

Cuando use un tanque rociador

- 44 ml (3 Cdas) por 3.8 litros de agua.
 - Rociar las plantas hasta que estén completamente cubiertas.
- Cuando use el aplicador Ortho® Dial 'N Spray®**
1. Coloque el disco selector en 1.5 fl oz (44 ml).
 2. Vierta el producto en el bote a llenar o medio lleno.
 3. **NO** agregue agua.
 4. Conecte la manguera al rociador.
 5. Rocíe las plantas de manera uniforme.
 6. El producto que no se utilice debe vertérse de regreso en el envase original.

HOW TO APPLY

- Apply as a thorough spray, wetting leaves and branches, but do not let runoff occur.
- Be sure to follow important limitations for the specific edible plant you are spraying, including the amount of spray which can be applied, the interval between sprays, and the days to wait before harvest.

VEGETABLES AND FRUITS	DAYS TO HARVEST	CALIFORNIA DAYS TO WAIT TO HARVEST
Corn (Sweet corn)	1	18
Tomatoes	1	Do not use
Citrus	1	Do not use
Blackberries, Raspberries	3	4
Lima Beans	3	9
Peas (Green pea, Snow pea, Sugar Snap pea), Beans (Snap bean, Wax bean), Blackeyed pea	3	Do not use
Chayote, Cucumber, Edible gourds, Cantaloupe, Casaba, Honeydew melon, Pumpkin, Summer squash (Zucchini), Winter squash (Butternut squash, Acorn squash, Spaghetti squash), Watermelon	3	3
Chinese mustard	7	Do not use
Broccoli, Chinese broccoli, Cabbage, Cauliflower, Eggplant	7	7
Head lettuce, Peppers (Bell and Non-bell), Artichoke	7	Do not use
Pears	14	Do not use
Pecans	21	Do not use

STORAGE & DISPOSAL

STORAGE: Keep from freezing. Keep pesticide in original container. Do not put into food or drink containers. Avoid contamination of feed and foodstuffs. Store in a cool, dry place, preferably in a locked storage area.

DISPOSAL: If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS**HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS**

CAUTION:
Do not apply this product to humans or animals.

FIRST AID

If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

Note to Physician: Emergency Information call 1-800-225-2883.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems. Drift and run-off from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. Care should be used when spraying to avoid fish and reptile pets in/around ornamental ponds.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming plants. Do not apply this product or allow it to drift to blooming plants if bees are visiting the treatment areas.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Do not apply this product in or on electrical equipment due to the possibility of shock hazard.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

THE ORTHO GUARANTEE

If for any reason you, the consumer, are not satisfied with this product, mail us your original proof of purchase to obtain a full refund of your purchase price.

**ELIMINACION GARANTIZADA
O LE DEVOLVEMOS SU DINERO!****ORTHO[®]
BUG B GON[®]
MAX[™]****MATA INSECTOS PARA CÉSPED Y JARDÍN** Concentrado

Mata hasta por 6 semanas

DATOS DEL PRODUCTO

MATA INSECTOS	Hormigas (incluyendo la carpintera, la roja recolectora, la del pavimento, la olorosa, la pirámide, la faraona y la argentina), áfidos, gorjillos, orugas, ciempiés, chinches, gusanos cortadores, avispones, pulgas, escarabajo japonés (adultos), milpiés, ácaros, grillo-topo, mosquitos, escorpiones, gusano peludo, garriapatas, avispas, moscas blancas y otros insectos de césped y jardín que se enumeran.
DONDE APlicAR	<ul style="list-style-type: none"> • Rosas y otras plantas ornamentales • Vegetales listados y árboles frutales • Árboles y arbustos • Céspedes • Alrededor de los cimientos de la casa, porches, patios y madera almacenada
CANTIDAD A APlicAR	<ul style="list-style-type: none"> • Rosas, plantas ornamentales, jardines de vegetales, melones y árboles frutales: Mezclar 3 cucharadas (44 ml) por 3.8 litros de agua. Rociar las plantas hasta que estén completamente cubiertas. • Céspedes: Mezclar 1.5 a 3 cucharadas (22 a 44 ml) por 3.8 litros de agua rocíandola para cubrir 12 metros cuadrados. • Alrededor de los cimientos de la casa: Mezclar 3 cucharadas (44 ml) por 3.8 litros de agua rocando para cubrir 6 metros cuadrados.
PERSONAS Y MASCOTAS	 Las personas y mascotas pueden entrar a las áreas tratadas después de que se haya secado el spray.

**Questions, Comments or Medical Information
Preguntas, Comentarios o Información Médica
1-800-225-2883**

Formulado especialmente para uso residencial.
NO USAR ADENTRO DE LAS VIVIENDAS

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Do not apply this product to humans or animals.

FIRST AID

If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

Note to Physician: Emergency Information call 1-800-225-2883.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems. Drift and run-off from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. Care should be used when spraying to avoid fish and reptile pets in/around ornamental ponds.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming plants. Do not apply this product or allow it to drift to blooming plants if bees are visiting the treatment areas.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Do not apply this product in or on electrical equipment due to the possibility of shock hazard.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

***THE ORTHO GUARANTEE:** If for any reason you, the consumer, are not satisfied with this product, mail us your original proof of purchase to obtain a full refund of your purchase price.



Questions, Comments or Medical Information
Preguntas, Comentarios o Información Médica
1-800-225-2883

© 2011 The ORTHO Group. World rights reserved.

Sold by

The ORTHO Group
P.O. Box 190
Marysville, OH 43040

Form LB1301AT020
EPA Reg. No. 239-2685
EPA Est. 239-IA-3^A,
58996-MO-1^A, 239-MS-001^M,
84064-IA-001^L, 085652-OH-1^W

Superscript is first
letter of lot number
Made in USA